

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE E AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
C.T.O. - C.R.F. - MARIA ADELAIDE**

Via Zuretti, 29 – Telefono (011) 69331 – 10126 Torino
Codice Fiscale e Partita IVA 06817560011

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI TRAUMATOLOGIA,
ORTOPEDIA E MEDICINA DEL LAVORO

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.

Via Zuretti, 29 – 10126 Torino

**U.O.D.U AMBULATORI INTERDIVISIONALI DI MEDICINA DEL LAVORO
AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA**

TEL. 011/6933461

FAX n. 011/6933771

VISITE ALLERGOLOGICHE

Documentazione da portare (se in possesso del paziente):

Per le Dermatiti:

- visite dermatologiche precedenti
- visite allergologiche precedenti
- test epicutanei e transcutanei effettuati in passato
- documentazione eventualmente in possesso del paziente relativa alle possibili sostanze di uso lavorativo
- terapia farmacologica precedente o in corso

Per le Asme:

- visite allergologiche precedenti
- visite ORL precedenti
- visite pneumologiche precedenti
- visite cardiologiche precedenti
- spirometrie precedenti
- test transcutanei effettuati in passato
- documentazione eventualmente in possesso del paziente relativa alle possibili sostanze di uso lavorativo
- terapia farmacologica precedente o in corso

Per le Oculorinti:

- visite allergologiche precedenti
- test transcutanei effettuati in passato
- visite ORL precedenti
- documentazione eventualmente in possesso del paziente relativa alle possibili sostanze di uso lavorativo
- terapia farmacologica precedente o in corso

Indicazioni per i pazienti:

Per le dermatiti, in caso di prima visita, sospensione della terapia cortisonica sistemica e topica ed antistaminica nei 15 giorni precedenti la visita, se possibile.

Per le asme:

- in caso di prima visita: se possibile, sospendere cortisonici e broncodilatatori per via inalatoria almeno nelle 24 ore precedenti la visita
- in caso di visita di controllo: continuare somministrazione farmaci prescritti (in base alle indicazioni fornite dal medico in occasione delle visite precedenti)
- in caso di sospetta asma allergica: sospendere se possibile anche l'eventuale assunzione di antistaminici nei 15 gg. precedenti la visita.